



EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESCUELA SALUDABLE DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19. ESCUELA PÚBLICA. SAN LORENZO 2021.

V Congreso de Educación y Pedagogía. UNAE

4 de junio - Prof. Rosa Ovelar.

En referencia a Entornos Saludables se realizaron varios ajustes a la infraestructura de la Institución educativa atendiendo la pandemia del COVID-19 a fin de cumplir con el protocolo sanitario establecido, se resaltó la importancia del cumplimiento del protocolo Sanitario mediante la cual los docentes observaron disminución de otras enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Respecto a la educación para salud con enfoque integral los docentes realizaban el filtro escolar a fin de detectar posibles casos sospechosos, así mismo ante la presencia de posibles casos aplicaban el aislamiento y seguimiento de los casos.

En cuanto a la Vacunación de los docentes si bien existían docentes que rechazaban la vacunación todos accedieron y cuentan con al menos una dosis. Finalmente se concluye que la implementación de la estrategia escuela saludable fue fundamental y de gran ayuda para la aplicación efectiva de los protocolos sanitarios durante la Pandemia del COVID-19.



CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN TRANSVERSALIDAD EN EL CURRÍCULO.

VIII Encuentro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales de la Universidad Autónoma de Encarnación.

Gerardo Armando Picón - 23 de abril 2022.

Los trabajos referenciales para este análisis se interrelacionan con la búsqueda de factores que conduzcan a afianzar los valores de integración y participación ciudadana vinculados a la escuela y la familia convirtiéndose éstos como motores esenciales en la adopción de la educación en valores o educación para la paz con disposición hacia la consolidación de una cultura de paz.

La inclusión de esta temática como eje transversal el currículo podría sustanciar el proceso de educación para la paz y el de la formación integral en la construcción y consolidación de valores fundamentales de los estudiantes universitarios entendida la transversalidad como el abordaje del estudio y análisis de problemáticas sociales que afectan el pleno desarrollo de las comunidades.



GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN EN UNIVERSIDADES PRIVADAS DE ASUNCIÓN Y DEPARTAMENTO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 2017 – 2020.

Vi Jornada Iberoamericana de Investigaciones en Políticas Educativas y Experiencias Interdisciplinarias en Educación.

13 AL 15 DE JUNIO. BRASIL - GERARDO PICÓN

Los resultados revelaron que ninguna de las instituciones poseía un modelo específico de internacionalización, sus acciones se basaban en su propio modelo educativo referido a la misión y visión; declararon haber conseguido mayor visibilidad internacional y prestigio en comparación con otras instituciones, aunque la mayoría consideró como debilidad la demanda de tiempo implicado en la gestión de la internacionalización.

La movilidad académica fue la elección mayoritaria como acción la cual durante la pandemia por Covid-19 estuvo representada por la participación en congresos, seminarios o talleres con proyectos de investigación conjuntos. Las gestiones de internacionalización fueron incipientes al no haber un marco regulatorio específico que la contemplara. Se sugiere asumir la internacionalización como compromiso inherente a la gestión institucional gestando estrategias innovadoras que potencien las funciones sustantivas de la educación superior.



NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA VACUNA ANTI COVID E IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO LOMA PYTA DE ASUNCIÓN EN PARAGUAY.

VIII Encuentro de Investigadores y XI Encuentro de Tesistas.

ADELAIDA PAIVA y MARIBEL ACOSTA. 30 de julio 2022

Los resultados indicaron que el 3% de los participantes no habían recibido la vacuna contra el COVID, 3% habían recibido una dosis y el 36% dos dosis. La mayor parte de los encuestados, 61%, tuvieron una alta aceptación hacia la vacuna, el 36 % con mediana aceptación y solo el 3% reportó baja aceptación. Respecto a las secuelas el 75% de las personas vacunadas no tuvo ninguna, el 11% dijo que sí presentando tos, fatiga, fiebre, gripe o dolor leve en el brazo y el 14% no consideró aplicarse la vacuna porque la vacuna era la propia enfermedad.

Respecto al impacto de las medidas restrictivas a causa de la pandemia en el plano económico, emocional y psicológico, el 56% los entrevistados manifestó haberse sentido muy afectado económicamente, el 34% afectado emocionalmente y el 10% psicológicamente. Sobre la percepción de las medidas de seguridad sanitarias como conocimiento adquirido durante la pandemia citaron el lavado adecuado de manos, utilización del tapabocas, la evitación o precaución de aglomeraciones y el distanciamiento social.



RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES MELLITUS TIPO II EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN POBLADORES DEL BARRIO SAN ISIDRO SAN LORENZO 2022.

VII Encuentro de la Sociedad Científica del Paraguay

ROSA DANIELA OVELAR Y GERARDO PICÓN

CARRERA DE ENFERMERÍA.

35% de los pobladores son >65 años; 55% IMC 25-30; 30% Hombres presentan perímetro de cintura 94 a 102 cm; 25 % mujeres con perímetro de cintura 80 88cm; 60% no realizan actividad física; 95% consumen frutas y verduras cada día; 55% reciben medicación para presión arterial; 30% con glucosa elevada; 50% presentan antecedente familiar. El 5% presenta un riesgo muy alto, 15% riesgo alto, 40% riesgo moderado, 30% riesgo ligeramente elevado, 10% riesgo bajo e desarrollar diabetes mellitus tipo II en los últimos 10 años.



LA PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA MAKÁ COMO RUTA TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO.

V Congreso de Educación y Pedagogía. UNAE

MARCELO ANDRÉS MORÍNIGO INSFRÁN Y LIZ FABIOLA GUILLEN CARDOZO

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL.

Los resultados indicaron que el 79% dijeron que la actividad artesanal de la Comunidad Maká atraería muchos beneficios al Municipio de Mariano Roque Alonso, el 89% que no tiene conocimiento de anuncios, publicidad o cualquier otro medio de promoción o difusión de las artesanías Maká, el 89% que la actividad artesanal podría ser un atractivo turístico para el Municipio el 47% que considera muy importante la artesanía Maká para el desarrollo del Municipio, el 42% que es importante, el 11% dijeron poco importante, el 74% que considera muy importante promocionar la Artesanía Maká como una ruta turística dentro de la SENATUR, el 21% que es importante, el 5% poco importante, el 71% que considera muy importante el turismo para el desarrollo del Municipio, el 21% que es importante, el 8% dijeron poco importante.



CLASES VIRTUALES EN PANDEMIA Y SUS REPERCUSIONES EN LOS NIVELES DE ESTRÉS

VII Encuentro de la Sociedad Científica del Paraguay

DOCENTE MARCELA CAROLINA AGUILERA TORRES.

CARRERA DE PSICOLOGÍA

Los hallazgos determinaron la casi nula capacitación del docente, la mayoría de ellos utilizó como herramienta de trabajo un aparato celular por ser el que disponían en el momento, la aplicación más utilizada fue WhatsApp y la plataforma del Ministerio de Educación y Ciencias cuando estaba accesible. La mayoría mencionó como regular la interacción y la comunicación con el alumno demostrando así un bajo nivel de interacción en el proceso de aprendizaje.

Sobre los niveles de estrés se demostró que era alto representando el 53% de los docentes encuestados, en segundo lugar, un 36% se identificó tener Síndrome de Burn-out. Reportaron que los niveles altos de estrés repercutieron en el aspecto fisiológico como tensiones musculares y dolores de cabeza, en el aspecto psicológico se manifestaron síntomas como ansiedad, irritabilidad y agitación, en el área comportamental los cambios se dieron en alteraciones como comer en exceso, arranques de ira y otros manifestaron cambios en sus hábitos alimenticios diario



IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES SIGNIFICATIVOS Y NO SIGNIFICATIVOS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS.

V Congreso de Educación y Pedagogía. UNAE

GERARDO ARMANDO PICÓN Y GLADIS JOSEFINA ZÁRATE VEGA.

Se determinó que los docentes establecieron la importancia de las estrategias de apoyo pedagógico para el uso de ajustes razonables inculcando valores para la inclusión a través de la utilización de un reglamento y planes curriculares. Se determinó que la escuela debía contar con barandales, baños adecuados, ubicación apropiada del mobiliario, cuidado del nivel del ruido, debida instalación de rampas e iluminación según la opinión de estudiantes y docentes. Los docentes consideraron que las adaptaciones para implementar ajustes razonables significativos debían ser la base de las necesidades, motivaciones y capacidades de los alumnos. Las adaptaciones para los ajustes razonables no significativos debían ser adecuaciones metodológicas y de evaluación que no comprometieran los objetivos del currículo.



AUTOMEDICACIÓN CON METILFENIDATO EN ESTUDIANTES DEL CURSO DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA MARÍA SERRANA, FILIAL CDE EN EL AÑO 2022

IV Congreso de Ciencias de la Salud, UNAE. 25 y 26 de noviembre

EDUARDA FERNANDA SCARAVONATTI BELTRAME, EVANESSA SILVA DE MENEZES,

TALITA DE MORAES, JULIA CONSTÂNCIO DOS SANTOS, LUCAS RATES BRANDAO,

WISTANA SANTOS LIMA, MONICA NOBREGA DE AZEVEDO, MATHEUS RUAN LIMA

MARTINS, NATALIA COSTA CHAVES BRANDAO Y FABIÁN FRANCO.

CARRERA DE MEDICINA CIUDAD DEL ESTE.

Un total de 40 personas (39.21%) manifestaron haber usado metilfenidato en algún momento de su vida, 30 (29.41%), dijeron que lo han hecho bajo prescripción médica. Entre los principales efectos adversos, podemos citar: náuseas (7,6%), insomnio (17,47%), disconfort (5,8%), taquicardia (17,47%), nerviosismo e irritabilidad (15,53%), cefaleas (17,47%), sequedad de boca (12,6%) y temblor de manos (8,7%). La frecuencia de uso del metilfenidato fue casi 2/5, siendo solo aprox un

9% los que la usan sin la correspondiente prescripción, según manifestaron los encuestados. Los principales motivos para el uso fueron para mejorar su concentración y disminuir la fatiga física y mental. Entre los principales efectos adversos que manifestaron tener destacan el insomnio, la taquicardia, nerviosismo e irritabilidad, cefaleas y sequedad de boca.



ANSIEDAD POR SEPARACIÓN DEL ADULTO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD MARÍA SERRANA DE CIUDAD DEL ESTE EN 2022.

IV Congreso de Ciencias de la Salud, UNAE. 25 y 26 de noviembre

EDUARDO ALENCAR, THIAGO ARAUJO, MILLENA FALCAO, GABRIELLY GOMES,

MAIKON LEITE, RUTHLEITE, DANIELA LIMA, ESLI MENDES, RUBENS MOTA,

HUMBERTO ONOFRE, LUNNA PEREIRA, NARCISO DE SOUZA, CLAUDIELLE SENA

DR. PROF. FABIÁN FRANCO.

CARRERA DE MEDICINA CIUDAD DEL ESTE.

La ansiedad es más frecuente de lo que las personas creen y que esta está también relacionada a la separación en el adulto, como sucede con alumnos de otros países, principalmente Brasil, que vienen a estudiar a Paraguay la carrera de medicina. También podemos ver, que, según la percepción de los estudiantes, esta ansiedad afecta su vida, su capacidad de realizar tareas y su rendimiento en los exámenes. Esta información, coincide con otras investigaciones de diversos autores, de distintas partes del mundo y de Latinoamérica



IMPACTO EDUCATIVO EMOCIONAL Y ECONÓMICO EN FAMILIAS DEL BARRIO LOMA PYTÁ DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A CAUSA DEL COVID -19

IV Congreso de Ciencias de la Salud, UNAE. 25 y 26 de noviembre

CHRISTIAN DAVID GONZÁLEZ GÓMEZ Y MARIBEL ACOSTA

CARRERA DE ENFERMERÍA.

La investigación permitió conocer los efectos de la cuarentena en las familias, cómo sobre llevaron la situación económica, si resultó favorable la decisión del Ministerio de Educación y Ciencias en cuanto a la educación virtual y como los afectó en lo emocional. La información recopilada brinda los siguientes porcentajes: un 60% de los encuestados son del sexo masculino y un 40% del sexo femenino, en cuanto al nivel educativo el 16% tenía primaria completa, el 56% secundaria completa y el 28% con un título universitario. En lo referente a contagios el 48% no contrajo el virus mientras que el 52% si; sobre los vacunados contra el COVID-19, el 96% con la aplicación de las tres dosis de la vacuna y otro 4% sin la aplicación de la misma, el 24% quedó con secuelas, un 76% no; las personas que quedaron sin empleo fue de un 70% y un 30% no les afectó, al 50 % le impactó en lo económico, al 30% más en lo emocional y un 20% en el ámbito educativo. La pregunta en cuanto a si tuvo algún fallecido en el entorno familiar el 24% había fallecido a causa del COVID-19 y el otro 76% no sufrió ninguna consecuencia a causa de la enfermedad.





ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR

IV Congreso de Ciencias de la Salud, UNAE. 25 y 26 de noviembre

MARIBEL MARCELA ACOSTA RODAS Y MARÍA DANILA FLEITAS.

CARRERA DE ENFERMERÍA.

Los resultados indican que el 100% en recomendaba la atención ofrecida por los alumnos a los familiares, con un 54% muy satisfecho, 38% satisfecho y con un 8% medianamente satisfecho; el 96% de las personas encuestadas le pareció adecuada la hora de visita y a un 4 % no; el 46% le pareció excelente el servicio recibido, un 26% le pareció bueno, con un 21% le pareció muy bueno y un 4 % le pareció regular la atención.

Durante las visitas domiciliarias por los alumnos, el 62% confirmó que el estudiante respondía muy bien a las preguntas realizadas por los entrevistados y el 38% que habían respondido bien a las preguntas realizadas. El 75% de los entrevistados no observaron ningún aspecto que mejorar, un 25% manifestaron que las atenciones de enfermería se realizaran en forma continua. Se determinó que el total de los miembros de las familias entrevistadas expresó que los estudiantes en todo momento respetaron su privacidad.



RIESGO DE APNEA DEL SUEÑO EN LA COMUNIDAD CERCANA A LA UNIVERSIDAD MARIA SERRANA EN ASUNCIÓN SETIEMBRE 2022

IV Congreso de Ciencias de la Salud, UNAE. 25 y 26 de noviembre

SERGIO EDUARDO PERNICONI

CARRERA DE MEDICINA, ASUNCIÓN.

La edad de los encuestados entre 11 a 60 años, mujeres 70% y hombres 30% apnea: leve 88% moderado 7% grave 5%. Al igual que el estudio realizado en México el mismo síntomas ronquidos fueron los más frecuentes donde 30 % encuentra en alto riesgo para SAOS, las mujeres resultaron ser la mayoría cuello corto y obesas.



TEST DE LA MARCHA DE LOS 6 MIN EN JUGADORAS DE FÚTBOL FEMENINO DEL CLUB OLIMPIA, SETIEMBRE 2022,

XI Foro de Investigadores de la UNIBE. 25 y 26 de noviembre.

MARIANA FURTADO TEJERINHA E ISABELLA CRISTINA MARCOLINO DOS SANTOS

BAJO LA TUTORÍA DE LA DRA. SHIRLEY GALEANO. CARRERA DE MEDICINA, ASUNCIÓN.

16 participantes, con edad entre 18 – 32 años, donde 12 (75%) atletas lograran obtener la distancia prevista establecida por la ecuación de Gibbons W. Apenas (4) 25% de ellas no alcanzaran dicha distancia, de esas apenas 1 se clasificaba con el índice de masa corporal (IMC) como sobrepeso. Los signos vitales no evidencian cambios significativos en toda la prueba. Todas consideraran tener una alimentación saludable y no tener enfermedad o contraindicaciones que las excluya de la prueba. Cien por ciento de ellas atingieran el nivel 4 en la clasificación de la 6MWT, según el riesgo de morbimortalidad, propuesta por Enright y Sherril (1998), lo cual el promedio recorrido por las deportistas quedó en 602 metros.



SECUELAS POR COVID 19 EN COMERCIALES DEL MERCADO 4 DE ASUNCIÓN.

XI Foro de Investigadores de la UNIBE. 25 y 26 de noviembre.

HAYANNE NUNES COUTINHO Y JOANA TEREZINHA DE OLIVEIRA.

CARRERA DE MEDICINA, ASUNCIÓN.

52 entrevistados, 65% son de sexo femenino y 35% sexo masculino. El 58% son vendedores (as), 28% son comerciantes, 12% ayudantes y 2% guardia. El 25% tienen 18 a 25 años, 14% de 26 a 32 años, 46% de 33 a 50 años, 15% mayor de 50 años. El 38% han tenido, 62% no han tenido el Covid-19.

El 96% no se hospitalizaron, 4% si fue en hospital. El 21% tiene enfermedad de base, 79% no tiene enfermedad de base. El 86% se vacunaron, 14% no se vacunaron. 24% tenía algún fallecido de la familiar por el covid-19, y 76% hablan que no. De este 38% que tuvieron Covid-19, todos tuvieron alguna secuela, algunos comerciantes y vendedores tuvieron más de un síntoma después del Covid-19 (secuelas), la amnesia y fatiga fue la que más se encontró entre los comerciantes y vendedores entrevistados. El 14% no estaba vacunado.



NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA ENFERMEDAD CELÍACA EN LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA MARÍA SERRANA.

XI Foro de Investigadores de la UNIBE. 25 y 26 de noviembre.

GUSTAVO ROJAS, NIMIA RODRÍGUEZ, MARIBEL ACOSTA, RONALDO ROLÓN.

CARRERA DE ENFERMERÍA.

Los resultados se presentan con base en las respuestas afirmativas, por lo tanto, la diferencia porcentual corresponde a las respuestas negativas de los encuestados. Los resultados indican que, el 58% ha escuchado sobre la enfermedad celiaca. El 44% respondió que, si conocía la enfermedad celiaca.

El 38% señaló que tenía conocimientos sobre las causas de la enfermedad de la celiacía y el 13% respondió saber sobre el diagnóstico de la enfermedad. El 15% afirmó identificar los signos y síntomas de la enfermedad celiaca, mientras que el 30% asumió poder precisar los alimentos que podían consumir los celíacos y el 41% admitió saber que alimentos que no podían consumir las personas diagnosticadas con esta enfermedad.



CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LAS INFECCIONES RELACIONADA A LA CANALIZACIÓN DE CATÉTER VASCULAR. HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LOMA PYTA, 2022.

XI Foro de Investigadores de la UNIBE. 25 y 26 de noviembre.

JESÚS CANTERO Y JAIME VESTER.

CARRERA DE ENFERMERÍA.

La edad mínima de los participantes fue de 24 años y la edad máxima de 57 años, así nos refleja una edad media de 37,95 años, la antigüedad media fue de 11,15 años, el 85,5% de los participantes corresponde al sexo femenino, el 40% refirió que no conoce de un protocolo institucional sobre prevención de infecciones relacionadas a la canalización.



EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN PRIVADA, ASUNCIÓN-PARAGUAY.

XI Foro de Investigadores de la UNIBE. 25 y 26 de noviembre.


JORGE QUINTÍN ZARZA DÍAZ, MAURA TATIANA JACQUET,

NIMIA RODRÍGUEZ Y DALILA MELGAREJO FERREIRA.

CARRERA DE ENFERMERÍA.

Se utilizaron variables sociodemográficas para caracterizar a los adolescentes, con un grupo etáreo de 15 a 17 años, predomina el sexo femenino, de escolaridad primero, segundo y tercero y mayor porcentaje énfasis en informática. Obteniendo en el pre-test como resultado significativo que han recibido información y la vía ha sido el maestro, médico y amigo/a. Considerando las ITS como Sífilis, VIH/SIDA y gonorrea; formas de contagio son sexo sin condón, sexo oral, compartir jeringas y transfusión de sangre sin analizar; conductas de riesgo en mayor porcentaje han sido promiscuidad, drogadicción y no uso de condón en relaciones ocasionales.

En el pos-test posterior a la intervención educativa, en mayor porcentaje conocen referente al VIH/SIDA, gonorrea, sífilis y herpes como su transmisión, síntomas y prevención.





ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y TIPOS DE CARÁCTER DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONYUGAL EN ZONAS DE LA GRAN ASUNCIÓN AÑO 2021.

XI Foro de Investigadores de la UNIBE. 25 y 26 de noviembre.

LILIANA NOEMÍ CÁCERES ESPÍNOLA.

CARRERA DE PSICOLOGÍA.

La edad de las participantes en el estudio estaba comprendida en el grupo de 27 a 44 años, la mayoría solteras, de formación universitaria y terciaria, que vivían en alquiler, trabajaban como empleadas y de forma independiente, de dos a tres hijos. Los resultados indicaron la utilización de 18 estrategias de afrontamiento de las cuales “centrarse en las emociones y desahogarse” fueron las más utilizadas como la de poder encontrar salida en forma cautelosa y calmada o guardar los sentimientos y emociones, mientras que la “negación” como estrategia fue la menos utilizada.

Entre los tipos de carácter más frecuente se encontró que el 35% era apático, el 23% de carácter sentimental, mientras que el 14% resultó de carácter nervioso y el 12% sanguíneo como dos tipos de carácter medianamente frecuentes.



AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DE UN CENTRO EDUCATIVO PRIVADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN.

**VI Congreso de Educación y Psicopedagogía.
Universidad Autónoma de Encarnación. 2023.**

BRAYHAN FERNÁNDEZ GIMÉNEZ Y DENISSE MONSERRATH PERALTA ALMEIDA.

Los resultados en el área personal ambos sexos presentaron una autoestima normal, reconocen y valoran positivamente sus rasgos y habilidades, esta valoración depende de su estado de ánimo y de las consecuencias que sus actos han tenido en el ambiente. En cuanto el nivel familiar en donde se observó en ambos sexos las relaciones familiares no le satisfacen, lo que genera distanciamiento y escaso compromiso familiar.

En área social los participantes masculinos, el mayor porcentaje tuvo una autoestima normal a alta, es decir que se sienten aceptados con sus pares y amigos, percibiéndose amados y valorados. En el sexo femenino se pudo ver un gran porcentaje con autoestima baja, con tendencia al aislamiento y dificultad para relacionarse con otros o establecer vínculos interpersonales. En el área académica se demostró que en ambos sexos predominaba la autoestima normal a alta, sintiéndose muy satisfechos por los logros académicos alcanzados y confianza en sus habilidades y capacidades. Se percibieron como un miembro importante de su curso o institución.



VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ CON PROYECCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU).

GERARDO ARMANDO PICÓN.

Actividades de educación para la paz pueden desarrollarse como parte de la formación integral del estudiante enfocadas a los valores de la paz, los valores humanos, la convivencia, el respeto a los derechos humanos, la discusión sobre violencia, los conflictos, los valores democráticos, la tolerancia, la solidaridad y el desarrollo humano. Son acciones de enseñanza aprendizaje que permiten vincularse con la comunidad como un servicio social en actividades interdisciplinarias de concienciación y promoción de los principios contenidos en la paz a través de la difusión del conocimiento de los derechos humanos.

A través de la implementación de este tipo de actividades de aprendizaje se generan alternativas desde la perspectiva de la transversalidad del currículo universitario con un accionar formativo con base en la responsabilidad social. La contextualización de este tipo de actividades favorece los principios de una educación para la paz e implican dinámicas de reflexión, análisis, transformación, concienciación y promoción de los principios que guían el comportamiento humano.



ANÁLISIS SOBRE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, ADECUACIONES CURRICULARES, FORMACIÓN DOCENTE EN EL ÁREA DE DISCAPACIDAD VISUAL, EN LA REGIÓN 00-17 DEL DISTRITO LA ENCARNACIÓN, DEPARTAMENTO CAPITAL DEL PARAGUAY.

Simposio Internacional. Investigación interdisciplinaria y Modelos Educativo. 2023

GERARDO ARMANDO PICÓN Y THAMARA SILVIA ELENA CUBILLA GARCÍA

Se determinó que las Adaptaciones Curriculares Significativas eran extremadamente útiles y las No Significativas y las Individualizadas muy útiles.

La formación específica que reciben los docentes era la didáctica especial y el ábaco. Entre las dificultades de los docentes resaltaron la falta de capacitación y la nueva conciencia en torno a la educación especial. Se concluye que la capacidad visual se despliega a través de programas secuenciados de actividades enfocadas a que el educando maneje su resto visual y consiga niveles de percepción visual adecuados.



ESTRESORES PERCIBIDOS POR DOCENTES EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN HÍBRIDA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19.

III Congreso Internacional Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 2023

GERARDO ARMANDO PICÓN y MARIELA VILLALBA

Los hallazgos muestran que la experiencia en la educación híbrida ha sido difícil, con fuerte presencia de factores estresores calificados como bastante estresantes.

Los rasgos característicos de los estresores percibidos por los docentes fueron la sobrecarga laboral, la falta de recursos tecnológicos adecuados, la falta de capacitación en el uso de las nuevas tecnologías, la preocupación por la salud propia y de los estudiantes y la necesidad de adaptación a una nueva modalidad enseñanza. La frecuencia con la que aparecen los estresores provenientes del entorno y la organización institucional fue elevada.



AFECTACIÓN CAUSADA A UNA DETERMINADA POBLACIÓN POR EL CHIKUNGUNYA.

Proyecto culminado de la Carrera de Enfermería. 2023

MARÍA DANILA FLEITAS PRIETO, RUTH MICAELA SILVERO MORINGO

Y MARIBEL MARCELA ACOSTA RODAS.

Los resultados evidenciaron que el 75% de los entrevistados conocía la forma de transmisión, el 90% afirmó haber tenido chikungunya, el 43% mencionó como síntomas los dolores articulares, el 32% fiebre, el 19% dolor de cabeza, el 3% vómito y diarrea. En cuanto a la intensidad de los síntomas presentados el 67% indicó que fue grave, el 22% leve y un 11% moderado. El 67% afirmó que tuvo algún tipo de recaída, 72% señaló haber consultado al médico, 80% indicó que conocía las medidas preventivas y 75% manifestó haber tenido dolores articulares como secuela.

Por tanto, en el futuro debemos atender a las medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad y la detección temprana que pueden ayudar a reducir el impacto en la salud pública y evitar complicaciones. Todavía no existe una cura o vacuna para el chikungunya, sin embargo, es crucial continuar con los esfuerzos de investigación y educación para minimizar la propagación de esta enfermedad.



PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UN HOSPITAL PRIVADO DEL ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA, AÑO 2023.

Proyecto culminado de la Carrera de Enfermería. 2023

PATRICIA BARRETO, JANE BENÍTEZ, CYNTHIA GAMARRA,

JESÚS BENJAMÍN PEÑA.

Esta investigación determinó la prevalencia del síndrome de burnout en personal de enfermería del área de terapia intensiva del hospital privado de Asunción. Este estudio fue cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, se utilizó el cuestionario de Maslach Burnout teniendo en cuenta los criterios de inclusión. La muestra estuvo conformada por 42 personal de enfermería, de los cuales 76,2% son femeninas y el 23,8% son masculinos. El resultado arrojó que el 46,3% tienen un nivel alto de cansancio emocional, mientras que el 42,9% tienen un nivel bajo de despersonalización y el 61,9% de nivel alto de Autorrealización.

Concluyendo que existe una prevalencia total del síndrome de burnout en los personal de enfermería del área de terapia intensiva.



LOCUS DE CONTROL EN ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL CORONEL VICENTE MONGELOS, ASUNCIÓN, AÑO 2023

GILARI RAMÍREZ, DULCE SALDÍVAR, JESÚS RAMÍREZ,

MARY SÁNCHEZ, JESÚS BENJAMÍN PEÑA.

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar cuál es el tipo de Locus de Control que predomina en los alumnos del 3er curso de bachillerato del Colegio Nacional Coronel Vicente Mongelos.

Estudio no experimental, cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, con una muestra de 30 alumnos, no probabilístico. De acuerdo con los resultados arrojados, en los alumnos existe un Locus de Control Interno con 60% y Locus de Control Externo en 40%. Se concluye que el Locus de Control que prevalece en los alumnos es el Interno.



NIVEL DE DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA Y PSICOLOGÍA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA, ASUNCION, PARAGUAY, 2023.

LORENA GALEANO, PAMELA LEGUIZAMON, VIVIANA VAZQUEZ,

ADA VERA, ARACELI GAONA, JESÚS BENJAMÍN PEÑA

Metodología de estudio no experimental, cuantitativo, descriptivo, como instrumento la prueba de depresión de Halmiton. Como resultados, el 44% de la población encuestada en dichas carreras presenta depresión, el 34% padece depresión menor, los síntomas que más predominan son de sentimiento de culpa, insomnio intermedio, insomnio tardío, síntomas somáticos gastrointestinales y generales, el área más afectada es la de sexo femenino con un 33%.



CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA ACERCA DEL ESTRÉS.

Semilleros de Investigación de la Universidad Privada María Serrana

ELÍAS RAFAEL CHAPARRO GIMÉNEZ, MARIEL ANAHÍ LEZCANO ÁVALOS,

DIEGO ISMAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MEL MILAGROS MAGALI RODRÍGUEZ

MORENO, PAULA LUJAN BENÍTEZ VERA, MAURA TATIANA JAQUET.

Como resultados del estudio se logró determinar que todos los participantes definieron correctamente el estrés, conocían los síntomas, causas, tratamientos; expusieron el conocimiento acerca del término coloquial “pico de estrés”, así también, distinguieron el rol del profesional de enfermería en la atención a pacientes diagnosticados con estrés; sin embargo, presentaron menores conocimientos en la identificación los tipos de estrés.

Se recomienda realizar capacitaciones constantes en el área de salud mental, seguir aplicando los conocimientos obtenidos para ampliar márgenes en el área de atención en salud, considerando las limitaciones de acción y acceso en esta área al profesional de enfermería.



ESTADO NUTRICIONAL Y PREVALENCIA DE OBESIDAD/SOBREPESO EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE ASUNCIÓN.

Semilleros de Investigación de la Universidad Privada María Serrana

GUSTAVO DANIEL ROJAS CABRERA, ESPERANZA MARÍA BENÍTEZ JORDÁN,

DALILA ALMIRÓN FERNÁNDEZ, DANIELA TROCHE PALACIOS Y

MARIBEL ACOSTA.

Los resultados fueron los siguientes, según la curva de crecimiento Talla/Edad, se obtuvo un 70% de estudiantes con talla adecuada, 14% en riesgo de talla baja y 6% de talla baja. En cuanto a la curva de crecimiento IMC/Edad, el 60% presentó un peso adecuado, el 17% con sobrepeso, el 8% con obesidad, 14% en riesgo de desnutrición y 1% con desnutrición.

En conclusión, se constata que la mayoría de los estudiantes presentan una buena talla de acuerdo con la curva Talla/Edad y un buen estado nutricional referente a la curva IMC/Edad, observándose una prevalencia de obesidad de 8% con el total de la población estudiantil. Sin embargo, es importante hacer el seguimiento a aquellos casos que presentan índice de obesidad y sobrepeso.



IDEACIÓN SUICIDA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA.

Semilleros de Investigación de la Universidad Privada María Serrana

NAILEA AYELEN ESCOBAR ORTIZ, DALMA YANINA GUTIÉRREZ PINTOS,

GABRIELA NOEMÍ BAZÁN BENÍTEZ, MARÍA NATALIA CABALLERO,

PAMELA BEATRIZ FERNÁNDEZ BENÍTEZ Y JESÚS BENJAMÍN PEÑA.

Los resultados del estudio incluyeron estudiantes universitarios de las carreras de medicina, psicología, contabilidad, empresariales, educación, enfermería, permitiendo identificar la presencia de variables de ideación suicida en estudiantes con un 22%, un deseo pasivo de suicidio 22% y 78% deseo activo de suicidio. El promedio de edad fue 18 a 28 años, 71% mujeres y 29% hombres.

En conclusión, se logró identificar la ideación suicida en estudiantes universitarios de una universidad privada, que corresponde 39% a estudiantes de medicina, 25% psicología y 18% enfermería, sin embargo, en el resto de las carreras no se identificó ideación suicida. No se encontraron diferencias estadísticas en cuanto al sexo en el factor ideación suicida. Se recomendó realizar estrategias con la Dirección de Bienestar Estudiantil para reducir/disminuir el porcentaje de ideación suicida de estos estudiantes.



IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES EXPUESTAS O POTENCIALMENTE EXPUESTAS A PLAGUICIDAS Y SÍNTOMAS POR INTOXICACIÓN AUTORREFERENCIADOS EN MINGA GUAZÚ.

Semilleros de Investigación de la Carrera de Medicina CDE

Fabián Franco, Nidia Viviana Ruiz Prieto, Antonio Pereira Rebouças,

Amanda Gabrieli Bueno, Carolyne Didima Cirqueira, Julia Louise Moraes Lyra,

Rudmar Polidoro, Sayonara De Oliveira Viggiano, Warlen De Oliveira Viggiano

El área no cuenta con estudios o análisis de contaminación por parte de ningún organismo público ni privado. La exposición humana a las fumigaciones es observable y fue referida por los pobladores.

La población está expuesta a contaminación por agrotóxicos, posee instituciones educativas y de salud con riesgo de exposición. Los síntomas más frecuentes reportados por la población son taquicardia, gastrointestinales y respiratorios y en menor medida dolores articulares, náuseas o vómitos e irritación de la piel y mucosas.



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA EN UNIVERSIDADES PRIVADAS DE CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY.

Semilleros de Investigación de la Carrera de Medicina CDE

FABIAN FRANCO, RONALDO RODAS, VICTOR JARA, ADOALDO LACERDA NEVES,

FELIPE DE SOUZA GOMES, JOSUÉ CALEBE DA SILVA SANTOS, YAN DOS SANTOS

GONÇALVES, YAN MONTEIRO FERRARI, RICARLOS ANÍBAL DOS S. DIAS,

WAGNER THOMAZ DE MIRANDA.

La muestra estuvo constituida por 135 estudiantes. 56,3% fueron mujeres, 53,3% ya poseían formación anterior. 28,6% consideran tener una mala calidad de vida, 15,6% necesitan atención médica más de lo normal, 27,6% poseen pocas ganas de realizar las tareas diarias, 28,9% dicen poseer menos recursos económicos que los que necesitan para cubrir sus necesidades diarias, 43,7% manifiestan estar poco satisfechos con su vida, 27,4% no están satisfechos con si mismos.



DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS EN EL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO.



Semilleros de Investigación de la Carrera de Medicina Asunción

DENISE FLAUZINA MOCELLIN, JOÃO VICTOR VIÇOSI Y SHIRELY GALEANO.

Desde el 1 de enero de 2022 al día 31 de diciembre del año de 2022, 73.227 pacientes pediátricos en el Hospital General de Barrio Obrero de Asunción del Paraguay.

Durante ese periodo fueron diagnosticados 114 pacientes con bronquiolitis y de esos 31 necesitaron atención hospitalaria más avanzada 01 paciente intubado, fue trasladado para un centro de mayor complejidad. Predominio del sexo masculino en los casos confirmados de bronquiolitis en el HGBO. 3 pacientes tuvieron más de una entrada por la misma patología, siendo uno de ellos gemelares (ambos con la misma enfermedad).

De los pacientes internados las edades de cada paciente están entre 10 días a 9 meses, siendo todos lactantes menores. Con una moda de 42 pacientes en la edad de 2 meses. Se obtuvo una media de 7 días de internación por paciente, siendo lo mayor tiempo de internación en el mes agosto, donde en el día 08 se obtuvo una internación por 19 días.





TEST DE ALLEN: PRUEBA DE LA CUBITAL.

Semilleros de Investigación de la Carrera de Medicina Asunción

RAFAEL SIQUEIRA ROJAS, DJONATAN MICHEL ZAPELARI ADAMI

Y OSCAR BENÍTEZ.

De los 33 profesionales encuestados, 20 (61%) no hacen la prueba durante la gasometría y 13 (39%) hacen la prueba de Allen durante la gasometría, 11 (34%) no saben para qué sirve la prueba de Allen, 6 (18%) comprobar una buena vascularización, 4 (12%) cuándo se hace la gasometría, 3 (9%) avalar el flujo sanguíneo, 1 (3%) valoración de la circulación y un total de 8 (24%) profesionales no contestó esta pregunta, 7 (21%) profesionales presenciaron una complicación y 26 (79%) nunca presenciaron una complicación de la gasometría arterial mal hecha, 22 (67%) profesionales saben las consecuencias y 11 (33%) no saben las complicaciones de una gasometría mal hecha.



INCIDENCIA DE NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA Y EXTRAHOSPITALARIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE EN EL AÑO DE 2022.

Semilleros de Investigación de la Carrera de Medicina Asunción

MARÍA GABRIELLA LOPES PEREIRA, GABRIELA BATISTA SOALLEIRO

DE ABREU Y ABRAHAM RODRÍGUEZ.

La revisión del año de 2022 de historias clínicas, desde enero de 2022 hasta diciembre de 2022, de pacientes que acuden al servicio de urgencia y clínica médica por neumonía. Se encontraron 337 casos de neumonía adquirida en la comunidad y 82 casos de neumonía intrahospitalaria. Dentro de los casos de Neumonía adquirida en la comunidad 175 fueron mujeres y 162 hombres, de los cuales 17 mujeres y 12 hombres llegaron a tener complicaciones, y 44 pacientes llegaron a óbito.

El tiempo de internación de 239 pacientes fue de menos de 7 días, y la procedencia que tuvo el mayor índice de casos fue de Luque con 240 casos, y en segundo lugar Areguá con 35 casos. el mes con recordé de casos relatados fue junio con 54 casos. Mientras que los casos de Neumonía intrahospitalaria constan de 38 casos femeninos y 44 casos masculinos, de los cuales 5 mujeres y 2 hombres llegaron a complicarse, y 30 pacientes fueron a óbito. Dentro de la procedencia con mayor incidencia fue Luque con 36 casos y en segundo lugar Limpio con 15 casos. El tiempo de internación de 31 pacientes fue de menos de 7 días, y 23 pacientes quedaron internados de 7 a 14 días.



CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL CHIKUNGUNYA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

Semilleros de Investigación de la Carrera de Medicina Asunción

WESLEY AUGUSTO GONZAGA RODRIGUES, CARLOS ALEXANDRE,

MIRTHA DENIS Y MONTEIRO LIMA.

Desde el período de enero/2023 a febrero de 2023, al que se totalizó el ingreso de 21 (veinte y uno) pacientes con diagnóstico conclusivo de Chikungunya, en el Hospital Regional de Luque ya que el centro médico posee mayor característica de atención a casos quirúrgicos.

Chikungunya afectó más a las pacientes de sexo femenino (15 casos) que a los pacientes de sexo masculino (6 casos). Las edades se relacionan con el sexo de cada paciente, donde mujeres son el mayor porcentaje (71%) que los hombres (29%). En las pacientes mujeres nos presentaron embarazadas (26%), entre 33 y 39 semanas de gestación, acudiendo al servicio de urgencia por los signos y síntomas de mayor ocurrencia, siendo ellos mialgia y artralgia



PERFIL Y EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES POR NEUMONÍA Y DERRAME PLEURAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

Semilleros de Investigación de la Carrera de Medicina Asunción

GIUSEPPE NUNES PEDROSA, THATHIANNA CHELSEA DE LIMA PONTES

Y MIRTHA DENIS.

Hubo 31 hospitalizaciones, con una estancia media de 7 días (1- 21). La edad media fue de 65 años, siendo 38,7% del sexo masculino, 61,3% del sexo femenino, 45,16% con comorbilidades y con 7 óbitos. Observamos que la mayoría de los pacientes afectados por estas condiciones eran adultos mayores, con una incidencia ligeramente mayor en mujeres que en hombres. Los factores de riesgo comunes incluyeron fumar, enfermedades crónicas (diabetes 10%, hipertensión arterial 25,8%, asma 6,4%), inmunosupresión y exposición ambiental.



TIPOS DE SÍNTOMAS HALLADOS EN FUMADORES DE POBLACIÓN ADULTA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CERCANA A LA UNIVERSIDAD MARÍA SERRANA, ASUNCIÓN.

Proyectos Libres

KAIO VINÍCIUS GONÇALVES MONTEIRO Y VICTOR GUSTAVO BARROS DA SILVA

Del total de 50, entre estudiantes y residentes, 27 (54%) eran hombres y 23 (46%) mujeres. Entre los encuestados, el 20% tenía menos de 25 años. Las ocupaciones, el 78% se destina a estudiantes, el 22% a ocupaciones como: médico, enfermera, abogada, psicóloga y jubilada. 38% fuman menos de 6 años, y el 62%, fuman por más de 6 años. El mismo resultado coincidió para la presentación de tos. Los que tenían más tiempo de uso tenían tos, y los que tenían menos tiempo de uso tenían el mismo porcentaje de años de uso.

De los encuestados el 100% dice no toser sangre, el 60% tiene los dientes amarillos, el 40% dice no tener relación con el cigarro. Y el 57% concluyó que ya intenta dejar de fumar, el 43% dice que nunca lo ha intentado. Entre todos estos datos, el 90% nunca trató de ayudar a dejar de fumar. y solo el 10% lo buscó alguna vez.



TUBERCULOSIS ADQUIRIDA EN ÁMBITO HOSPITALARIO.

Proyectos Libres

YANKA MARYLYA SANTOS SOUZA Y RENATO DO AMARAL KOVALSKI

Se presenta el caso clínico de un paciente de 33 años de edad, que fuera remitido al Servicio del Hospital General de Luque por presentar debilidad generalizada (con astenia, decaimiento del estado general, inapetencia, con dolores musculares generalizada, de inicio insidioso, que cede con la ingesta de analgésicos comunes) durante un período aproximado de 15 días, además de acompañar un cuadro de sensación febril, de predominio nocturno, que termina en lisis con escalofríos. Posteriormente manifestó una tos húmeda con expectoración blanquecina, sin estires de sangre de predominio nocturno.

Relató que al correr de los días la astenia persistió hasta el día del ingreso, acompañado de náuseas y vómitos a varias oportunidades. Se determinó clínica y radiológicamente la existencia de hidroneumotórax; además de un cuadro tuberculoso y una hepatoesplenomegalia y desnutrición.



RELACIÓN DE LA RESILIENCIA CON LA CONCILIACIÓN VIDA LABORAL - VIDA FAMILIAR.

Xxxix Congreso Interamericano De Psicología.

JUAN PABLO GERARDO ACHAR ROJAS

CARRERA DE PSICOLOGÍA.

Resultados: Se halló una relación muy baja entre los constructos, siendo $Rho = .154$ con un P -valor = 0.031. En torno a las relaciones interfactores los niveles de relación corresponden a niveles bajos y muy bajos y; excepcionalmente moderados. Mientras que las comparaciones presentan diferencias muy puntuales entre algunos estratos. Conclusión: Se puede señalar que la resiliencia y la conciliación trabajo-familia presentan relación, pero la misma es muy baja lo que puede denotar que existen otros determinantes de la variabilidad de las puntuaciones.